

新鐵多用藥指導

中文商品名

新鐵多專為缺鐵性貧血設計，採用 Sucrosomial®專利技術，提供高效吸收且溫和無副作用的補鐵體驗，適合成人、孕婦、兒童的理想選擇，輕鬆改善鐵不足的健康困擾。



新鐵多利用微脂體技術，減少傳統鐵劑的腸胃刺激，但仍建議隨餐或飯後服用並搭配維生素 C，避免影響吸收的食物與藥物，且務必遵照醫囑，切勿過量。

用法

膠囊：每日一次，隨餐或飯後吞服，配水食用。

補充期間有哪些注意事項

提升吸收與注意事項

搭配維生素 C：與芭樂、奇異果等富含維生素 C 的食物同時食用，能幫助吸收。

避開禁忌：

時間間隔：避免與茶、咖啡、牛奶、鈣片、高鐵食物等同時服用，建議間隔 2 小時。

藥物：若有服用其他藥物，請諮詢醫師或藥師，避免交互作用。

特殊考量：

腸胃敏感者：若空腹服用不適，可改為隨餐或飯後服用。

保存：置於陰涼乾燥處。 請置於孩童無法取得與看見之處。

※此衛教單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

秀傳醫院關心您

藥品諮詢電話:2771-7172 分機 60015 海美刀中心諮詢電話: 2772-2338